

АМИНОЗОЛ®

Органичен NK- тор, течен произведен от странични животински продукти от материал категория 3, съгласно EG (VO) 1069/2009, хидролизирани протеини

Съставки: 9,4 % общ Азот (115 гр/л N), 1,1 % общ калиев оксид (15 g/l K₂O), съдържа още: обща Сяра (S) 0,25 %, от които водоразтворими 0,23 %; общ Натрий (Na) 1,28 %, от които водоразтворими 1,26 %; 66,3 % органична субстанция

Плътност: 1,23 kg/l

pH- стойност: 5 - 7

Цвят: кафяв

Смесваемост

Аминозол® се смесва с общоприетите препарати за растителна защита. Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са предвидими, за всеки случай е необходима смесителна проба с малки количества от предвидените за пръскането продукти.

Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка на поносимостта. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита дозата да се напълни 2/3 с вода и продуктите да се добавят по отделно. Аминозол® винаги разреден с вода да се прибавя последен.

Съхранение

В затворена опаковка, защитено от пряка слънчева светлина, при температури между -5 и 35°C е възможно дългогодишно съхранение .

Култура	Цел	Препоръка
При всички култури	Намаляване на стреса	0,2 - 0,3 л/дка при стрес. Многократната употреба на малки дози повишава ефективността.
"	Подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита	150 - 300 мл на 100 л вода при пръскане с препарати за растителна защита
"	Третираните култури се избягват от диви животни и гризачи	200 мл/дка 2 - 3 дни преди пръскане да се разтвори с 2 л вода при необходимост
<u>Ягода, зеленчуци (</u> <u>Плодни зеленчуци,</u> <u>Зелеви, листни и лукови</u> <u>зел, Аспержи,</u>	Образуване на корени, нарастване, начално развитие	Потапяне на растенията в 1% разтвор или съответно леко поливане с 0,5 - 1 л/дка преди разсаждане или 7 - 10 дена след

кореноплодни и кл)

↗ Ягода, ↗ Храстовидни плодове

вързване на плодове, качество

насаждането

2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от началото на цъфтежа до брането

↗ Ягода

качество на размножителните насаждения: здрави растения, образуване на отводи

2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка 14 и 7 дни преди брането

↗ Семкови плодове

завръз на плодове, за големина и цвят на плода, намаляване на ръждата

2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка при ябълката: червена пъпка и стадия на пълнене на плода; круша: преди и след цъфтежа

"

подобряване на ефективността и поносимостта на пръскането с калциев хлорид

0,1 - 0,2 л/дка пре пръскане с калциев хлорид

↗ Семкови плодове, ↗ Костилкови плодове, ↗ Ягода, ↗ Храстовидни плодове, ↗ Десертно грозде

натрупване на хранителни резерви, регенериране, студоустойчивост, качество на цвета

2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка след брането

↗ Костилкови плодове

завръз на плодове, растеж на плода, по-малко шарка

3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от цъфтежа в интервал през 8 дни

"

срещу симптоми на шарка по листата и плода

3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка (без препарати за растителна защита) от цъфтежа в интервал през 30 дни

↗ Винено грозде

равномерно развитие, хомогенна зрялост

4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка след раззеленяването, при пълния цъфтеж, при повторния цъфтеж, при оформяне на гроздовете

↗ Житни култури

добив, жизненост

0,2 - 0,3 л/дка към края на брането

↗ Картофи

по-бързо възстановяване на шумата след сваляне на фолиото при ранните картофи

0,2 - 0,3 л/дка при първото мероприятие с препарати за растителна защита след сваляне на фолиото

↗ Захарно цвекло, ↗

подобряване на

0,1 -0,2 л/дка към хербицидите

<u>Рапица, Царевица, Картофи, зеленчуци (Плодни зеленчуци, Зелени, листни и луковични, Аспержи, кореноплодни и кл)</u>	ефективността и поносимостта на пръскането с хербициди след поникване, добив	след покълване, особено при екстремни агрометеорологични условия
<u>Слънчоглед</u>	подобряване на ефективността и поносимостта на пръскането с хербициди след поникване, добив	0,1 -0,2 л/дка към хербицидите след покълване, особено при екстремни агрометеорологични условия
<u>Декоративни растения</u>	качество на листата, растеж	многократна употреба с 100 - 300 ml на 10 л вода (0,2 - 0,3 л/дка) по време на периода на вегетация
<u>Разсадник</u>	образуване на корени, растеж, прираст	потопяне на изходния основен материал в разтвор от 1% или алтернативно поливане с 1%-ен разтвор (3 - 4 л/кв. м) при засаждането
<u>Тютюн</u>	Образуване на корени, нарастване, начално развитие	потопяне на таблите с разсада в разтвор от 1 % или неоформените растения се ръсят с 0,3%-ен разтвор съответно се поливат с 1л/дка преди засаждането съответно 7 - 10 дена след садене